NVD7

Hull II (Novemb. 1948)

Jordart.	Dyp m.	Vannpst. av total subst.	Vannpst. av tørr subst.	H_3	H_1	F	K	O	G	pH	δ^g
Leire m/melsand og finmo.	1	20,3	25,6	215	44	31	4.4			6.9	1.92
—"— m/melsand.	2	23.3	30,5	87	9,0	30	2.2			7.5	1,83

312H

Prøvehull SI. (mai 1947).

Jordart:	Dyp m	Vannpst. av total subst.	Vannpst. av tørr subst.	H_3	H_1	F	K	O	G	pH.	δ^g
Stolpeleire m/finsand. meget fast.	2	21.3	27,1	1350			10	0,4		6.1	1,99
—"— —"—	3	23,0	29,9	1050	107	46	9,6	0		6.7	1.95
Leire, ensartet —"—	4	23.3	30,4	332	45	37	5,8	0		7.0	1.94
—"— —"— —"—	5	25,3	33,8	215	25	38	4,5			7.2	
—"— m/enkelte sand og gruskorn. —"—	6	26,6	36,3	162	21,4	42	3,7				1.87
—"— m/sand, grus og melsand, sorte flekker	7	29.0	41.0	186	8,9	40	4,0	0		7.1	
—"— —"— —"— —"— —"— —"— —"—	8	26,5	36,0	193	9.0	36	4,1			7,4	1,85
—"— —"— —"— —"— —"— —"— —"—	9	23.5	30,7	180	9,8	31	4,0				
—"— m/sand og melsand. —"— —"—	10	28,9	40,7	132	8,7	39	3,1	0		7,5	1.91
—"— —"— —"— —"—	11	23,4	30,5	132	7.0	30	3,1				
—"— m/sand, grus og stein.	12	21,5	27.3	124	6,3	26	3,0				1.89
Sand og melsand, leirholdig.	14	21.1	26,7	(116)	(9,8)	(27)	(2.9)			7,5	
Leire m/melsand, skiktvis grov, ren sand.	16	27.5	37,8	110	12,5	39	2.8				1,92

313H