50: C1 II

209 H

Prøvehull 6. (1939.)

JORDART Elvebunn ÷ 1.60	Dyp under elvebunn m	Prøve på kote	Vannpet av total subst	Vannpet av tørr subst	H_3	H	[illegible]	K	γ	Anm.
Gjørme	0,40	-2,00	25,8	34,5			8,0		1,76	
—"— m/sand-flis	0,80	-2,40	57,8	137,5	(33)	(8)	8,2		1,31	
Flis, frisk - fast	1,30	-2,90	79,4	57,5			8,0		(0,86)	
—"— —"— —"—										
—"— —"— —"— m/bark (humus)	3,00	-4,60	76,8	330			8,2			
—"— —"— —"— noe gjørmet (-•-)	3,60	-5,20	51,0	177			8,2		0,93	
Gjørme m/flis (-•-)	3,80	-5,40	36,1	56,4	(168)	(37)	8,1	(3,8)	1,05	
Gjørmeaktig leire (-•-)	4,40	-6,00	32,8	48,7	102	19	8,0	(2,6)	1,70	
Renere leire m/litt sand	4,80	-6,40	29,5	41,4	102	20	8,2	2,6	1,78	
Ren leire	4,90	-6,50	30,0	42,9	111	21		2,8	1,79	
—"— —"—	5,30	-6,90	28,6	40,4	102	26		2,6	1,74	
—"— —"—	5,70	-7,30	28,5	40,1	102	20	8,2	2,6	1,86	
—"— —"—	6,10	-7,70	30,2	43,3	117	19		2,9	1,83	
—"— —"—	6,50	-8,10	28,5	40,1	96	24		2,5	1,84	
—"— —"— litt sandholdig	6,90	-8,50	25,3	33,9	56	40	8,4	1,6	1,94	x)
Leire m/grus-sand, trerester	7,30	-8,90	23,9	31,1	102	46		2,6	2,06	
—"— —"—	7,70	-9,30	23,4	30,2	102	48		2,6	2,00	
—"— —"—, sterkere sandbl.	8,10	-9,70	19,0	23,4	88	29	8,5	2,3	2,00	
Ren leire, fast	8,50	-10,10	29,2	40,7	180	20		4,0	1,82	
—"— —"— —"—	8,75	-10,35	28,4	37,8	137	19	8,2	3,2	1,86	
—"— —"— —"—	8	-10,75	28,1	39,0	142	27		3,3	1,86	
—"— —"—	9,55	-11,15	27,7	38,2	102	26		2,6	1,93	
—"— —"—	9,95	-11,55	27,5	38,0	117	30	8,3	2,9	1,92	
—"— —"—	10,35	-11,95	27,8	38,6	120	34		2,9	1,87	
—"— —"— —"—	10,75	-12,35	27,7	38,2	152	37	8,3	3,5	1,90	
—"— —"— —"—	11,15	-12,75	28,6	40,1	162	38		3,7	1,84	
—"— —"— —"—	11,55	-13,15	29,3	41,5	137	38		3,2	1,84	
—"— —"— —"—	11,95	-13,55	29,6	41,9	132	37	8,2	3,1	1,90	
—"— —"— —"—	12,35	-13,95	27,9	38,8	193	49		4,1	1,85	
—"— —"— —"—	12,75	-14,35	27,1	37,1	128	49		3,1	1,96	
—"— —"— —"—	13,15	-14,75	26,0	35,1	200	48		4,3	1,87	

x) Et hårdere skikt i prøven viste H_3 = 146, K = 3,4

Haukelid tgn. 412