SOC2

BISPEBRYGGEN
Serie I
(Inventarserie 1087)

LARGE (1937)

BL. 1906.
133 U

Se bl. 1908

Dybde fra terreng i m.	Kolehdide	Vektst. vann av tørrsubst.	Holdfasthetstall H_3 omrørt	H_2 halvomrørt	H_1 urørt	H_3/H_1	Avskjæring kg/cm²	pH-verdien	Clorsalte i % av jordtørrstoff	Humusinnhold i %	Anmerkninger
4,9	-5,05	32,2	146,5 162		20,7 19,7		0,33				4,7-5,3 m. Øverst endel stein stærkt filsatt med kult-
5,0 -5,2	-5,15 -5,35	28,7		64 64,5	19,0 "			7,9	2,85		og kalksgrus, mer og mindre humifiserte plantereester, kort, sv. grønlig
5,85	-6,0	29,0	200 215		12,2 12,0	18,0					5,7-6,3 m. Finsandholdig ler med fossilrester,
6,25	-6,40	24,4	174 124		12,0 12,2		0,31				massen kort, humus av forskj. sort, svakt grønlig.
6,8	-6,95	27,5	240 225		14,8 12,5						6,7-7,3 m. Finsandh., kort,
7,1 -7,3	-7,25 -7,45							8,0	2,96		lite synlige planterester, mange fossiler, sv. grønlig skjær,
7,2	-7,35	27,4	101,5 116,5		15,2 13,7		0,255				svak svovlvannstoffflukt
7,85	-8,0	27,0		55,1 52,7	12,8 13,1						7,7-8,3 m. Finsandh. mer plastisk, meget humus,
8,15	-8,30	27,7	141,5 116,5		18,7 17,4	8,1					synlige planterester, mange fossiler, kvikkalkig, ustabil, glir lett ut.
8,75	-8,92	27,4	215 186,5		21,4 19,7						8,7-9,3 m. St. finsandh., kvikkalkig, enkelte
9,1 -9,3	-9,27 -9,47							8,0	3,08		svev. sten, ikke synlige planterester, inneholder
9,2	-9,37	26,8	162 200		25,0 23,5		0,37				adskillig humus, overgangssone.
10,8	-10,97	25,8		46 40	28,6 27,5						10,7-11,3 m. St. finsandh., enkelte tynde sandlag,
11,25	-11,42	27,3	95,5 101,5		46 38	2,6					foregått indre forskyvninger, fossiler, sarg, blålig
12,35	-12,52	21,4	200 "		36,5 "		0,425				12,2-12,8 m. Blå farve, svev. sten,
12,6 -12,8	-12,78 -12,98							~8,2	2,98		meget finsandholdig.
12,7	-12,88	21,1	107,5 95,5		76 65,1						
13,85	-14,07	29,4	225 240		36,5 35,3	6,8					13,7-14,3 m. Meget sarg, mørk blålig
14,2	-14,42	27,8	193 200		44 40		0,42				med svakt grønlig skjær.
15,6	-15,71	27,0	240 225		85 80						15,5-16,1 m. Fastere masse, mange
15,8 -16,0	-15,91 -16,11							8,0	3,09		kalkrester
16,0	-16,11	27,5	200 186,5		50,3 55,1	4,0					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	174 [illegible]		40 40		0,385				17,8-18,4 m. Som siste prøve.
18,1	-18,48	28,1	[illegible]		34,4 34,1						
20,65	[illegible]	26,1	[illegible]		37,5 35,1						20,5-21,1 m. Som foregående.
21,0	-21,18	23,4		62 60,5	44 46						
23,35	-23,54	24,6	[illegible] [illegible]		31,3 28,6		0,425				23,5-24,1 m. Sand- og stenholdig
23,95 24,1 24,1	-24,04 -24,20 -24,10	23,0	[illegible] [illegible]		[illegible] 27,5	4,0		8,0	2,21		
26,35	-26,56	22,2	[illegible] [illegible]		28,6 32,5						26,5-27,1 m. Stærkt finsandholdig,
[illegible] [illegible] 27,1	-27,31 -27,21							8,3	2,28		mange muslinger, peccer meget animalsk humus
27,6	-27,11	26,8	[illegible]		26,8 [illegible]		0,3				
29,6	-29,80	23,8	[illegible] [illegible]		24,3 21,9	3,9					29,5-30,1 m. Som foregående.
29,85	-30,0	26,2	[illegible] [illegible]		14,5 27,7						
32,55	[illegible]	23,3	[illegible]		24,3 [illegible]						32,5-33,1 m. Skjærrester, rene
33,0 33,1	[illegible] [illegible]							8,2	0,70		sandlag, meget animalsk humus.
33,0	[illegible]	26,2	[illegible] [illegible]		24,3 [illegible]	8	0,465				