Ved Hoff.

FROGNER IS — HOFF
Gnr 31 Parsell av b nr. 46-55

TABELL OVER PRØVESERIE II
(Inventarserie 1068)

NVC3
LARGE
(1935-36)

BL. 1833

405U

Terreng + 8,0 m.

Se blad 1810

| Dybde fra terreng i m. | Kotehøide i m | Vekt % vann av total-substans. | Holdfasthetstall $H_3$ uomrørt | $H_2$ halvomrørt | $H_1$ omrørt | $H_3/H_1$ | Avskjæring kg/cm² | pH-verdien | Humusinnhold i % | Anmerkning. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 | 5,7 | 36,8 | 299<br>270 | | 26,8<br>25 | 11,9 | 0,55 | | | D = 2,0-2,6 m. Nøitral, ruster jern, sterkt sandholdig, lerkongresstone |
| 3,3 | 4,7 | 26,8 | 270<br>284 | | 19,7<br>17,4 | 16,0 | | | | D = 3,0-3,6 m. Svakk., sterkt sandh., friksjonsmasse, meget humus i begge |
| 4,10 | 3,9 | 23,5 | 200<br>240 | | 9,8<br>10,8 | | 0,48 | | | D = 4,0-4,6 m. Sterkt alk., øverst sandh, nogen |
| 4,5 | 3,5 | 22,9 | 101,5<br>90 | | 10,4<br>9,8 | 10,4 | 0,255 | | | sten, halvplastisk, nederst blöt, kvikkaktig. |
| 6,15 | 1,85 | 23,4 | | 52,7<br>64 | 10,4<br>9,6 | | | | | D = 6,0-6,6 m. Plastisk, blöt, delvis omrört $H_2$ |
| 6,5 | 1,5 | 23,2 | | 55,1<br>57,5 | 9,8<br>9,6 | | | | | |
| 8,15 | ÷0,15 | 26,0 | 107,5<br>90 | | 6,9<br>8,3 | 15,6 | 0,27 | | | D = 8,0-8,6 m. Kvikksandholdig, samtlige |
| 8,5 | ÷0,5 | 25,9 | 200<br>186,5 | | 6,9<br>7,2 | 29,0 | 0,425 | | | prøver minder sterkt om kvikkler. |

Oslo, 5-12-36

E Gran